

LISTE DES REPTILES DE MAURITANIE RECUEILLIS PAR LA MISSION
D'ÉTUDES DE LA BIOLOGIE DES ACRIDIENS EN 1936 ET 1937.
DESCRIPTION D'UNE SOUS-ESPÈCE NOUVELLE D'ERYX MUELLERI

Par F. ANGEL.

La Mission d'Études de la Biologie des Acridiens, dirigée par M. ZOLOTAREVSKY a fait parvenir, au Muséum, deux petits envois de Reptiles capturés en Mauritanie par M. Marc MURAT. Le premier comportait quelques échantillons de l'Adrar, de l'Akchar et du Tasiast ; les exemplaires du second provenaient de la Mauritanie occidentale, dans la région située entre Akjoujt et l'Océan. Parmi eux, une nouvelle sous-espèce d'*Eryx muelleri* nous paraît digne d'être décrite.

Stenodactylus sthenodactylus (Licht.).

Adrar-Oued Tangharoda, 13 déc. 1936 ; Zemmour (Beziah) 20 nov. 1936.

Connu du Nord et du Nord-Est africains, de l'Ouest de l'Asie, a été aussi retrouvé au Sahara (Fort Flatters) et à Tahoua, au Soudan, par M. H. LHOÏE.

Tarentola delalandii (Dum. Bibr.).

Zemmour (Beziah) et Poste de Bir Moghreïn, 22 nov. 1836, et, entre Akjoujt et l'Océan.

Les séries longitudinales de tubercules agrandis sont peu visibles sur la région dorsale ; les bandes transversales foncées sur le dos et la queue, manquent chez un exemplaire. Les granules blanchâtres n'existent que sur la partie antérieure du dos où ils marquent les quatre angles d'un carré, entre les épaules.

Connu de l'Ouest africain où sa répartition s'étend de Madère à la Guinée, y compris les Iles Canaries et du Cap-Vert. Selon M. Murat, les indigènes craignent ce Gekko dont ils croient, à tort, la morsure très venimeuse.

Agama mutabilis Merr.

Tasiast ; Rhat Atoui à Dmkehden, 6 févr. 1937 et Akjoujt et l'Océan. Serait commun dans le Tasiast ; son habitat comprend le

Nord africain jusqu'à l'Égypte, le Sahara central où on le rencontre dans les massifs montagneux et dans le Tanezrouft ; dans le Sud jusqu'aux confins saharo-soudanais. Espèce mimétique, habitant les « regs » désertiques.

Acanthodactylus scutellatus dumerilii M. Edw.

Cap Timiris : El M'amghar, 28 fév. 1937 ; Tasiast : Ogla de Tamarat, 18 fév. 1937 ; entre Akjoujt et l'Océan, fin 1937. Cette variété n'est connue jusqu'à présent que de la Mauritanie et du Sénégal.

Acanthodactylus scutellatus aureus Günth.

Rio de Oro : Aguerguer ; Guerguérat ; 29 janvier 1937. Jeune exemplaire ♀ montrant sur la nuque et sur le dos des lignes longitudinales pâles et sur les membres des grandes taches blanches serties de noir, formant un chaînon longitudinal sur chacun d'eux.

Cette forme est confinée à la partie extrême-ouest du Sahara, entre le sud marocain et le Nord-Ouest de la Mauritanie.

Acanthodactylus boskianus asper Aud.

Entre Akjoujt et l'Océan ; fin 1937.

La répartition de cette variété est très grande, s'étendant en longitude, sur tout le travers de l'Afrique, au Nord de l'Équateur, à l'Est jusqu'en Mésopotamie ; en latitude, de la Tunisie au Soudan.

Scincus officinalis Laur.

Tasiast : Oued Aïmou ; 4 févr. 1937.

Habitat : Nord africain ; Sahara central ; Égypte et Syrie.

***Eryx muelleri subniger* subsp. nov.**

Entre Akjoujt et l'Océan.

Nous proposons ce nom de sous-espèce pour un exemplaire qui présente les caractéristiques suivantes : 43 écailles autour du milieu du corps, 9 autour de l'œil, 5 entre les yeux. Ventrals : 181 ; Anale entière ; sous-caudales : 18. Rostrale très proéminente, 3 fois plus large que sa portion visible d'au-dessus. Une grande plaque médiane formant « coin » entre les internasales qui ne se touchent que par un point, en arrière de la rostrale. Épaisseur de la queue contenue deux fois dans la longueur de celle-ci. La longueur totale de l'animal représente 23 fois la longueur caudale (chez la forme typique cette proportion ne paraît pas dépasser une quinzaine de fois). Le plus grand exemplaire de *Eryx muelleri forma typica* que possède le

Muséum atteint 500 millimètres ; l'exemplaire présent mesure 825 millimètres dont 35 pour la queue

Coloration. Tête et dos, brun uniforme. De chaque côté du tronc des petites taches blanc-jaunâtre forment l'amorce d'une bande longitudinale irrégulièrement interrompue. Partie inférieure des côtés et plaques ventrales, brun plus ou moins maculé de clair, mais la teinte foncée l'emportant sur la teinte claire. Dessous de la tête et gorge, brun uniforme.

Eryx muelleri a été décrit d'après un exemplaire provenant de Nubie ; depuis, le Muséum en a reçu de Gao, au Soudan, du Haut Dahomey et du Sénégal. La sous-espèce *subniger*, chez laquelle n'existent pas les grandes taches dorsales foncées sur une teinte fondamentale claire et où les ventrales sont marbrées de clair et de foncé, représente probablement une forme spéciale à la Mauritanie.

Malpolon moilensis (Reuss).

Entre Akjoujt et l'Océan.

Répandu de l'Ouest de la Perse à l'Ouest africain sur les contrées du Nord de l'Afrique et du Sahara.

Psammophis schokari (Forsk.)

Habitat : Afrique, au nord de l'Equateur, Arabie, Syrie, Afghanistan, Ouest de l'Inde. Déjà retrouvé au Hoggar, dans le Sahara, sa capture, entre Ajoujkt et l'Océan, indique une répartition plus méridionale que celle qui était admise antérieurement.

Cerastes cerastes (Linné).

Entre Akjoujt et l'Océan.

Connue antérieurement de l'Afrique du Nord, Arabie, Sud de la Palestine a été rencontrée depuis au Sahara dans de nombreuses régions jusqu'aux confins saharo-soudanais (Aïr, Tefedest, Hoggar, Adrar des Ifohras, Oasis de Bilma, Tassilis des Azdjers et de Timissao.

Cerastes vipera (Linné).

Entre Akjoujt et l'Océan.

Comme l'espèce précédente, descend beaucoup plus au Sud qu'on le supposait antérieurement. Dans le Sahara central, elle habite les régions suivantes : Hoggar, Tanezrouft, Adrar des Ifohras, Oasis de Bilma, confins Saharc-soudanais.

(Laboratoire de Zoologie [Reptiles et Poissons] du Muséum).